



Ma vache a mis bas plusieurs fois des jumeaux, est-ce normal ?

Cher membre du CTA,
Notre association fait l'élevage des bovins. Nous avons observé un phénomène étrange chez l'une de nos vaches. Elle a déjà fait 3 mises-bas suite auxquelles elle a toujours eu des jumeaux. Est-ce parce que cette vache a été saillie toutes les trois fois par le même taureau? Est-ce parce que cette vache a été saillie par plusieurs taureaux? Ou alors ces mises-bas sont-elles liées à la nature de la vache? Est-ce que ces mises-bas de jumeaux peuvent causer le vieillissement précoce de la vache? Quels conseils nous donnez-vous pour la prise en charge de cette vache?

**Molole Sango
Bujumbura – Burundi**

Cher Molole Sango,

Le fait qu'une vache mette bas des jumeaux est un phénomène naturel. C'est le fonctionnement des ovaires qui fait varier le nombre de petits. Le système de reproduction chez la vache se rapproche de celui de l'homme. Autrement dit, cela n'a rien à voir avec

le fait que cette vache aurait été saillie par le même taureau quand elle était en chaleur, encore moins parce qu'elle aurait été saillie par plusieurs taureaux.

Par ailleurs, une vache allaitante a besoin de beaucoup de protéines et

de sels minéraux et encore plus quand elle a des jumeaux. Pour cela, en plus du fourrage normalement consommé, l'animal aura besoin d'un aliment complémentaire, ceci pour pallier à tout éventuel problème de fatigue de la vache. En effet, plus elle est bien

alimentée, mieux elle se porte et le sevrage se passe plus vite.

Voici un exemple de ration alimentaire journalière pour votre vache allaitante. En plus de l'herbe, vous pouvez lui donner au choix:

- Soit 1 kg de tourteaux d'arachide ou de coton
- Soit 1 kg de drêche et de maïs concassé
- Soit 1 kg de graines de coton et de mil écrasé.

Vous pouvez alterner ces éléments selon les jours. C'est-à-dire un jour vous donnez les tourteaux d'arachide ou de coton, un autre vous servez la drêche et le maïs concassé, ainsi de suite. Par ailleurs vous pouvez servir dans les mêmes proportions que les éléments cités ci-dessus, de l'aliment concentré vendu dans les provenderies. Bon à savoir, il n'est pas question d'engraisser votre vache, mais de lui donner des éléments nutritifs pour corriger les carences dues à l'alimentation uniquement à l'herbe.

Si cette vache est ainsi bien nourrie pendant qu'elle allaite, il y aura une bonne croissance des veaux et leur sevrage peut se faire à 1 ou 2 mois. Il ne se posera donc pas de problème de vieillissement précoce de la vache. **Bon courage!**



Est-ce que le tétanos peut attaquer les chèvres ?

Monsieur

Nous vous écrivons cette fois pour solliciter des conseils en élevage des chèvres. En effet nous élevons les chèvres depuis quelques années mais nous observons un phénomène peu ordinaire chez les nouveau-nés (chevreaux). Il s'agit des chevreaux qui ne grandissent pas, ils ont des poils dressés, même après cinq mois de mise-bas, ils ne jouent pas comme d'autres chevreaux nouvellement nés. Ils ne mangent pas convenablement.

- Est-ce que ces chevreaux ont manqué de vitamines à leur naissance? Ou

bien est-ce parce que leur mère ne consommait pas du bon fourrage avant la mise-bas? Ou alors cette mauvaise croissance est-elle liée à la température?

- Pouvez-vous nous conseiller un traitement pour renforcer leur santé? J'aimerais aussi savoir si les animaux peuvent souffrir du tétanos? Si oui, est-ce que le tétanos peut attaquer les chèvres?

**Molole Sango
Bujumbura – Burundi**

sensibles sont: les cochons, les chevaux et autres herbivores. Cependant, les chats et les chiens sont assez résistants à cette maladie.

Le tétanos est une maladie très dangereuse chez les animaux, car la mortalité par paralysie respiratoire peut survenir entre 24 heures et 10 jours. Vous comprenez que si votre chevreau était atteint du tétanos, sans aucun soin, il n'aurait pas survécu jusqu'aujourd'hui.

C'est une toxi-infection dont l'incubation peut durer plus d'une semaine. Voici comment se manifeste le tétanos chez les animaux:

- une torpeur,
- une incapacité de préhension des aliments,
- une difficulté de la démarche,
- une piloérection (poils dressés),
- une rigidité extensive.

Quand les premiers signes commencent à se manifester, l'animal peut mourir dans les 24 heures qui suivent.

Que faire donc en cas d'attaque du tétanos?

On neutralise la toxine avec des injections intramusculaires d'immunoglobulines (sérum antitétanique). On utilise les pénicillines pendant 5 à 10 jours par voie intramusculaire. Les tétracyclines sont également actives. On peut utiliser des sédatifs et des myorelaxants. Tout cela est disponible en pharmacie vétérinaire.

Comme il est évident que votre chevreau ne souffre pas du tétanos,

ce que vous devez faire actuellement, c'est de commencer par lui donner un vermifuge que vous trouverez dans n'importe quelle pharmacie vétérinaire proche de vous.

Vous devez aussi donner du bon fourrage à vos animaux, accompagné d'une source minérale telle le sel de cuisine ou un bloc à lécher que vous leur servez régulièrement pour la bonne constitution des os et de certains métabolismes.

Vous vouliez aussi savoir si l'alimentation de la mère pouvait affecter la qualité du lait pour les chevreaux? Nous disons oui. Mais en général chez les animaux, c'est le premier lait (colostrum) consommé à la naissance qui est très déterminant pour la santé du jeune animal, car ce lait est très riche en anticorps capable de protéger le petit dans son nouvel environnement. Chez la chèvre particulièrement, les chevreaux sont capables de brouter de l'herbe tendre dès le premier ou le deuxième jour après mise-bas, ainsi le sevrage a lieu normalement après 3 mois de tétée.

Enfin, vous avez fait allusion à la température, vous auriez mieux fait de nous dire quel climat il fait actuellement dans votre localité. Ça ne saurait être un problème de chaleur, sinon votre chevreau n'aurait pas survécu jusqu'à 5 mois d'âge. **A bientôt**

Cher ami,

Votre chevreau de 5 mois qui n'arrive pas à manger convenablement souffre probablement des vers intestinaux ou

d'une mauvaise alimentation.

Parlant du tétanos, c'est une maladie commune à l'homme et aux animaux. Les animaux domestiques les plus



Cette page vous est offerte par CTA avec la collaboration du Centre de Documentation pour le Développement Rural (CDDR)

Le CDDR est situé à Etoa-Meki : entre le nouveau Supermarché Mahima et le carrefour Etoa Meki à Yaoundé. B.P. : 7519 Tél.: 99 41 41 41 E-mail : cddr@saild.org ; Site web : http://pmb.sicac.org/opac-css